

Preparación VCC: Videocolonoscopia



AYUNO TOTAL
DE 6 HS*



ASISTIR CON UN
ADULTO RESPONSABLE



NO CONDUCIR HASTA
12HS DESPUÉS DEL ESTUDIO

DÍA PREVIO AL EXAMEN



24 HS

ANTES DEL
ESTUDIO

- Evitar frutas, verduras y lácteos.
- Tomar abundantes líquidos claros no gasificados (agua mineral, bebidas refrescantes sin gasificar, caldos colados, jugos colados, mate, café o té).
- **Desayuno** normal
- **Almuerzo:** carnes blancas o rojas poco condimentadas/pastas. Gelatina de frutas.
- **Merienda** normal

12 HS

ANTES DEL
ESTUDIO

- Tomar cuatro comprimidos de Bisacodilo con un vaso de agua sin masticarlos. Después de tomar los comprimidos de Bisacodilo puede tomar la cantidad de líquidos claros no gasificados que desee (agua mineral, jugo tipo gatorade de pomelo, caldos colados, jugos colados, mate, té).

6 HS

ANTES DEL
ESTUDIO

- Comience a tomar Barex, tomando un vaso grande (aproximadamente 250 cc) cada 15 minutos hasta completar la totalidad de la solución reconstituída (2 litros). La tolerancia es mejor tomando el vaso completo y bien frío rápidamente en lugar de tomarlo de a pequeñas cantidades.

***Puede ingerir líquidos claros no gasificados hasta 6 horas antes del estudio.**

Preparación VCC: Videocolonoscopia

DÍA DEL EXAMEN



EXAMEN A REALIZAR POR LA MAÑANA - PREPARACION CON BAREX KIT

- AYUNO TOTAL DE 6 HS. SUSPENDER TODA INGESTA ORAL HASTA EL MOMENTO DEL EXAMEN**
- Como el estudio se realiza con anestesia, debe asistir acompañado por un adulto responsable y no podrá conducir vehículos durante las 12 hs posteriores a la realización del examen.
- No es necesario suspender ningún tipo de medicación a excepción de los suplementos de hierro por boca, los cuales deben ser interrumpidos 3 días antes del estudio. Suspender la ingesta de aspirinas las 48 hs previas.
- Pacientes anticoagulados o que tomen antiagregantes plaquetarios: deberán presentar por escrito la indicación de su médico clínico, hematólogo o cardiólogo, en donde explique la conducta a seguir con estos medicamentos.
IMPORTANTE: Debe estar indicado cuándo suspender, reanudar y si se encuentra apto para este procedimiento.
- Si es diabético y está medicado por hipoglucemiantes, insulina o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera.
- Si bien estar embarazada no es un impedimento, si lo está o cree estarlo, debe comunicarlo al médico que realizará el estudio.
- Recuerde que debe completar un formulario de evaluación de salud ("cuestionario para pacientes") y firmar un consentimiento informado previo a la realización del examen.