




Información al paciente:

Vacunas



CLÍNICA MONTE GRANDE

Antigripal



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Gripe estacional.



Indicación

Indicada a partir de los 6 meses, adultos y embarazadas.



Reacciones adversas

Son poco frecuentes, las más comunes se observan en el sitio de aplicación: enrojecimiento, inflamación, induración y dolor. Ocasionalmente pueden ocurrir síntomas de tipo gripal de corta duración, incluyendo fiebre. Ceden espontáneamente a las 24 – 48 h.



Dengue



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

El Dengue, producido por los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.



Indicación

Indicada a partir de los 4 años, sin límite de edad (con o sin antecedentes de infección por el virus del dengue). La vacuna puede coadministrarse con otras vacunas de calendario y/o estacionales (antigripal). Dos dosis con un intervalo de 3 meses.



Reacciones adversas

Dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección
Dolor de cabeza
Dolor muscular
Malestar general
Debilidad
Fiebre
Ceden espontáneamente en 24-48 h. En ocasiones, puede aparecer dolor de cabeza, artralgia, mialgia y sarpullido a partir de la segunda semana después de la aplicación que duran entre 3-4 días.



Doble Bacteriana



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Difteria y tétanos.



Indicación

Esquema básico de vacunación: 3 dosis (0,1,6 -12) con un intervalo de 1 mes (si nunca recibió esquema primario). Luego un refuerzo cada 10 años.



Reacciones adversas

Son raras. Las más comunes se observan en el sitio de aplicación: enrojecimiento, inflamación, induración y dolor. En algunos casos puede aparecer fiebre o malestar general. Ceden espontáneamente en 24-48 h.



Hepatitis A



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Hepatitis causada por el virus tipo A.



Indicación

En Calendario Nacional la primera dosis a los 12 meses de edad. Se puede aplicar a partir del año de vida y sin límite de edad, 2 dosis con un intervalo de 6 a 12 meses. Consulta con tu médico las indicaciones de edad, según marca comercial.



Reacciones adversas

Ocasionalmente signos inflamatorios leves en la zona de aplicación. Ceden espontáneamente en 24-48 h.



Hepatitis B



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Hepatitis causada por el virus tipo B.



Indicación

Recién nacidos, dentro de las 12h de nacimiento. A los 2, 4 y 6 meses para vacunas combinadas. A los 11 años, para iniciar o completar esquema. Adultos sin antecedentes de vacunación se aplican 3 dosis: las 2 primeras con intervalo de 1 mes y la tercera dosis 6 meses después de la primera.



Reacciones adversas

Ocasionalmente signos inflamatorios leves en la zona de aplicación. Ceden espontáneamente en 24-48 h.



Herpes Zóster (Shingrix)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

El desarrollo de Herpes zóster o culebrilla, el dolor asociado prolongado o neuralgia post-herpética que es la complicación más frecuente y otras complicaciones asociadas a esta enfermedad.



Indicación

Todos los adultos a partir de los 50 años en un esquema de dos dosis con un intervalo no menor a dos meses. En adultos con mayor riesgo de herpes zóster, como las personas con inmunocompromiso a partir de los 18 años, también se administran dos dosis, pero con un intervalo de 1 mes.



Reacciones adversas

Puede ocasionar molestias, dolor, picazón o enrojecimiento en el sitio de la aplicación, que son leves y temporarias.



Meningococo ACYW (menveo/nimenrix)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Ayuda a proteger frente a las infecciones causadas por la bacteria llamada “Neisseria meningitidis” de los tipos A, C, W-135 e Y.



Indicación

En Calendario Nacional a los 3, 5, 15 meses. Niños de 11 años. A partir de los 12 meses de vida, adolescentes y adultos es una dosis.



Reacciones adversas

Ocasionalmente signos inflamatorios leves en la zona de aplicación que ceden espontáneamente dentro de las 24–72h. Si aparece fiebre, utilizar el antitérmico recomendado por el médico.



Meningococo B (bexsero)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

La meningitis y la enfermedad grave por meningococo del serogrupo B.



Indicación

Se puede aplicar a partir de los 2 meses de vida. El número de dosis a administrar depende de la edad a la que se inicia la vacunación y según prescripción médica.



Reacciones adversas

Leves. Las más frecuentes son fiebre e irritabilidad. Puede provocar dolor y enrojecimiento en el sitio de aplicación. Si aparece fiebre utilizar el antitérmico recomendado por el médico.



Neumococo conjugada



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Infecciones producidas por el neumococo como: neumonía, meningitis, otitis y otras formas graves de la enfermedad.

Indicación



Indicada por calendario a los 2, 4 y 12 meses de vida. Se indica una sola dosis a partir de los 65 años y en menores de esa edad está indicada en personas con factores de riesgo, también se aplica una dosis con prescripción médica.



Reacciones adversas

Enrojecimiento, inflamación, dolor en la zona de aplicación que ceden espontáneamente. Si aparece fiebre utilizar el antitérmico recomendado por el médico.



Poliomielitis



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

La poliomielitis o parálisis infantil.



Indicación

A los 2, 4 y 6 meses y único refuerzo en niños que cumplen 5 años. También viajeros que ingresen a zonas de riesgo.



Reacciones adversas

Dolor e inflamación en el sitio de aplicación. Puede aparecer fiebre moderada, la que cede espontáneamente.



Quíntuple acelular con Salk (pentaxim)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Tos convulsa, Difteria, Tétanos, Poliomiélitis. Y las infecciones invasivas causadas por *Haemophilus influenzae* tipo B: meningitis, celulitis, neumonía, epiglotitis.



Indicación

Se puede aplicar a partir de los 2 meses de vida.



Reacciones adversas

Las más comunes se observan en el sitio de aplicación: enrojecimiento, inflamación, induración y dolor. Puede aparecer fiebre o malestar general que cede espontáneamente en 24-48 horas. Si aparece, utilizar el antitérmico recomendado por el médico.



Quintuple celular (DPT-HIB-HB)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, enfermedades por Haemophilus Influenzae b (meningitis, celulitis, neumonía y laringitis) y Hepatitis B.



Indicación

2, 4, 6 meses y refuerzo a los 18 meses.



Reacciones adversas

Puede aparecer enrojecimiento, hinchazón y dolor en el sitio de aplicación. Fiebre, irritabilidad, llanto prolongado, cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Raramente reacciones adversas neurológicas.



Rotavirus



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Protege contra la diarrea y la gastroenteritis aguda producida por el rotavirus.



Indicación

En Calendario Nacional a los 2 y 4 meses.



Reacciones adversas

En raras ocasiones: vómitos, febrícula e irritabilidad leve.



Séxtuple acelular



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

La Tos convulsa, la Difteria, el Tétanos, la Poliomiелitis, la Hepatitis B e infecciones invasivas por el *Haemophilus influenzae* tipo b (meningitis, celulitis, neumonía, epiglotitis).



Indicación

A partir de los 2 meses de vida. Se aplican 3 dosis con un intervalo de 2 meses entre cada dosis o el esquema indicado por el pediatra.



Reacciones adversas

Raras. Las más comunes se observan en el sitio de aplicación: enrojecimiento, inflamación, induración y dolor. En algunos casos puede aparecer fiebre o malestar general. Ceden espontáneamente en 24-48 h. Si aparece, utilizar el antitérmico recomendado por el pediatra.



Tetravalente bacteriana con Salk (Tetraxim)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Difteria, tétanos, tos convulsa (coqueluche) y poliomielitis.



Indicación

Indicada como vacuna de refuerzo al ingreso escolar.



Reacciones adversas

Son leves y de corta duración. Las más frecuentes son enrojecimiento, inflamación y dolor en el sitio de aplicación.



Triple bacteriana acelular (adacel/Bustrix)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

La Tos Convulsa, la Difteria y el
Tétanos.



Indicación

11 años (calendario nacional).
Adultos, en reemplazo de una dosis
de Doble Adultos.
Embarazadas a partir de la semana
20ª de gestación, (en cada embarazo).
Personal de salud.



Reacciones adversas

Puede provocar inflamación,
induración y dolor en el sitio de la
aplicación. En algunos casos puede
aparecer malestar, fatiga, cefalea.



Triple Viral



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Sarampión, parotiditis y rubeola.



Indicación

A los 12 meses primera dosis.
A los 15-18 meses segunda dosis (nacidos 1-07-2024). Refuerzo a los 5 años con el ingreso escolar (nacidos antes del 30-6-2024).
Adultos que no tengan 2 dosis de vacuna deben completar este esquema.
Viajeros: niños y niñas de 6 a 11 meses deben recibir una dosis (dosis 0), que no debe ser tenido en cuenta para el esquema de calendario.



Reacciones adversas

Luego de la aplicación puede observarse: Fiebre moderada entre la primer y tercer semana luego de la vacunación. En algunos casos erupciones después del 5º día de vacunación y malestar general. En el sitio de aplicación: enrojecimiento e inflamación. Todos estos signos y síntomas se resuelven en pocos días.



Tuberculosis BCG



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Tuberculosis, especialmente las formas graves.



Indicación

Antes del egreso de la maternidad o durante la primera semana de vida hasta los 4 años 29 días.



Reacciones adversas

Es rara la aparición de fiebre. Pueden presentarse reacciones locales: Ulceración prolongada, formación de abscesos, adenopatías locales de gran tamaño y/o supuradas, con o sin fistulización (linfadenitis por BCG). Puede considerarse normal la presencia de una pequeña adenopatía axilar. Son reacciones leves o moderadas de evolución prolongada, pero curan espontáneamente.

Luego de la vacuna:

Entre la 2º y 4º semana de la aplicación, generalmente, aparece un nódulo (pequeña dureza) o ulceración con secreción. Esta última puede durar 2 a 3 meses, y no requiere cuidados especiales, sólo higiene con agua y jabón (se aconseja no tapar la zona ni usar desinfectantes o cicatrizantes).



Varicela



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

La varicela.



Indicación

En Calendario Nacional a los 15 meses de edad y refuerzo a los 5/6 años. Los nacidos a partir del 1/10/2013 deben certificar dos dosis de varicela. De acuerdo a la indicación médica, se pueden aplicar a partir del año de vida, sin límite de edad, 2 dosis con intervalo mínimo de 6 semanas.



Reacciones adversas

Luego de la aplicación, en algunos casos puede observarse: Fiebre moderada entre la primera y tercera semana luego de la vacunación. En algunos casos erupciones después de la primera semana de vacunación y malestar general. En el sitio de aplicación: enrojecimiento e inflamación. Todos estos signos y síntomas se resuelven en pocos días.



VPH Nonavalente (Gardasil 9)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

El cáncer de cuello de útero, otro tipos de cáncer anogenitales y orofaríngeos. Verrugas genitales causadas por las cepas del Virus del Papiloma Humano 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

Indicación



Esquema Calendario Nacional de

Vacunación: una dosis de 11 a 20 años. Dos dosis de 21 a 26 años (intervalo mínimo de 6 meses).

Inmunocomprometidos, tres dosis (esquema 0,1,6 meses). La estrategia nacional define una edad límite hasta los 26 años.

Recomendación según prospecto: dos dosis de 9 a 14 años inclusive. A partir de 15 años e inmunocomprometidos tres dosis.



Reacciones adversas

Las más frecuentes son enrojecimiento, inflamación, dolor y prurito en el sitio de aplicación. Puede provocar fiebre. Si aparece, utilizar el antitérmico recomendado por el médico.



VSR Adyuvantada (virus sincicial respiratorio- Arexvy)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Las infecciones del tracto respiratorio inferior causadas por el virus sincicial respiratorio (VSR).



Indicación

Indicada para adultos mayores a partir de los 50 años.



Reacciones adversas

Dolor en el lugar de inyección, cansancio, dolor de cabeza, mialgia (dolor muscular) y artralgia (dolor en las articulaciones). Enrojecimiento e inflamación en el sitio de inyección, fiebre, escalofríos.



VSR no Adyuvantada (virus sincicial respiratorio- Abrysvo)



¿Qué enfermedad previene esta vacuna?

Las infecciones del tracto respiratorio inferior causadas por el virus sincicial respiratorio (VSR).



Indicación

Indicada para embarazadas entre las semanas 32 y 36.6 de gestación, y en adultos a partir de los 60 años. Indicada en adultos entre los 18 y 59 años con riesgo de complicaciones.



Reacciones adversas

Posteriormente a la aplicación puede presentar cansancio, dolor de cabeza, mialgia (dolor muscular), dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de aplicación.



